

- [3]戴慎,薛建国,岳沛平.中医病证诊疗标准与方剂选用[M].北京:人民卫生出版社,2001:122.
- [4]郑筱萸.中药新药临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:388-390.
- [5]李雪荣.现代儿童精神医学[M].长沙:湖南科学技术出版社,1994:72.
- [6]肖代齐,燕树勋.数字划消试验在治疗儿童多动症中的应用及观察结果[J].中华临床医药杂志,2004,11(7):5.
- [7]陈贵廷,薛赛琴.最新国内外疾病诊断标准[M].北京:学苑出版社,1991:220-223.
- [8]张明园.精神科评价评定量表手册[M].长沙:湖南科学技术出版社,1994:89.
- [9]丁正香,朱克俭,刘天舒,等.小儿智力糖浆治疗小儿多动症50例疗效观察[J].湖南中医杂志,2008,24(5):33-34.
- [10]袁静,郭华,王玉水.脑功能生物反馈联合益智汤治疗儿童注意力缺陷多动症[J].天津医药,2005,33(4):241-242.
- [11]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:89.
- [12]王惠梅,张惠清,梁英仪,等.太原市儿童注意多动障碍流行病学调查[J].中国心理卫生杂志,1997,11(1):47.
- [13]苏林雁.儿童多动症[M].北京:人民军医出版社,2005:4.
(收稿日期:2009-06-04,修回日期:2009-08-03)

[编辑:邓媛]

· 临床解惑 ·

怎样选用中成药治疗血栓闭塞性脉管炎

胡献国 胡皓

(湖北省远安县中医院,444200)

血栓闭塞性脉管炎(简称脉管炎),是常见的动脉慢性闭塞性疾病之一,多发生于青壮年男性,后期可导致肢端坏疽或溃疡,甚至需要截趾(指)、截肢,使患者丧失工作和生活能力。

本病多为青壮年男性,可有吸烟、外伤或寒冻史,慢性发病逐渐加重过程。早期症状为间歇性跛行、发凉、皮肤苍白、动脉搏动减弱;中期症状加重,出现静息痛和皮肤营养障碍,皮肤紫绀,动脉搏动消失;晚期发生肢端坏疽或溃疡。根据缺血程度的轻重,临床上将脉管炎病程分为三期。第一期局部缺血期:属早期阶段,间歇性跛行为本期特征性症状,患肢麻木、酸胀、发凉。足背和/或胫后动脉搏动减弱或消失。第二期营养障碍期:该期为第一期病情加重,出现静息痛是本期主症,疼痛夜间剧烈,患者抚足而坐,不能入睡。患肢营养障碍性改变。动脉搏动消失。第三期组织坏死期:病情至晚期,出现肢端坏疽或溃疡,坏疽多为干性,局限在足趾、足部,少数累及踝关节甚至小腿,并发感染时坏疽转为湿性,溃烂、流脓。可有纳少、消瘦、贫血、高热等症状。

脉管炎病在《内经》中已有记载:“发于足趾,名脱疽”,自晋代皇甫谧《针灸甲乙经》开始称之为“脱疽”。脉管炎的治疗目标为控制炎症的进一步发展,有效改善动脉供血。除了要求患者绝对戒烟、进行足部运动以增加侧支循环外,采用中医治疗有显著效果,可有效控制炎症反应、改善血液循环,降低截肢率。

1 内治法

脉络阴寒证:主要表现为患趾(指)喜暖怕冷,麻木,酸胀疼痛,多走疼痛加剧,稍歇痛减,皮肤苍白,触之发凉,趺阳脉搏动减弱;舌淡、苔白腻,脉沉细。当以温阳散寒、活血通络为治,可选用阳和丸,每次9g,每日3次;脉管炎片,每次8片,每日3次;金匮肾气丸,每次9g,每日3次。

脉络血瘀证:主要表现为患趾(指)酸胀疼痛较重,夜难入睡,步履艰难,患趾(指)皮色暗红或紫暗,下垂更甚,皮肤发凉干燥,肌肉萎缩,趺阳脉搏动消失。舌暗红或有瘀斑、苔薄白,脉弦涩。当以活血化瘀、通络止痛为治,可选用脑血康滴丸,每次10~20丸,每日3次;三七片,每次4片,每日3次;血府逐瘀口服

液,每次1支,每日3次。

脉络瘀热证:主要表现为静息痛,足凉而自觉灼热感,皮肤干燥,汗毛脱落,爪甲增厚变形,肌肉萎缩,皮色暗红,趾(指)干性坏疽。口干欲饮,舌红、苔黄,脉弦细数。当以养阴清热、活血解毒为治,可选用复方金银花冲剂,每次10g,每日3次;复方丹参片,每次5片,每日3次;柴枳四逆散,每次10g,每日3次。

脉络热毒证:主要表现为肢端坏疽或溃疡,周围皮肤暗红,皮肤溃破流脓,腐肉不脱,甚至扩大上攻,腐烂筋骨。痛如火灼,夜间剧烈,常彻夜抱膝而坐。全身伴发热、口渴喜饮,尿黄短赤,大便秘结。舌质红绛、苔黄燥或腻,脉弦数。当以清热解毒、活血通络为治,可选用四妙丸,每次9g,每日3次;西黄丸,每次6g,每日2次;银黄口服液(每次1支,每日3次)合三七片(每次4片,每日3次)。

气血两虚证:主要表现病程日久,坏死组织脱落后或截肢术后创面久不愈合,肉芽淡而不鲜,全身倦怠乏力,面色无华,形体消瘦,舌淡,脉细无力。当以益气养血为治,可选用八珍口服液,每次1支,每日3次;十全大补丸,每次9g,每日3次;八珍益母丸,每次9g,每日3次。

2 外治法

新瘡片:取本品8~12片研为细末,用凡士林适量调为膏状外敷患处,敷料包扎,胶布固定,每日换药1次,连续使用1~2周。可清热解毒,通络止痛。

云南白药粉剂:取本品适量,加蒲黄粉少许,用清水适量调匀,外敷患处,敷料包扎,胶布固定,每日换药1次,连续使用1~2周。可清热解毒,通络止痛。

正骨水:将本品适量倒入热水盆中洗浴,每日1~2次,并用热毛巾湿敷至膝关节上下,每次10~30min。可活血化瘀,通络止痛。

独活止痛搽剂:局部常规清洗后,取本品适量外搽疼痛处,并用热毛巾湿热敷,每日2~3次,每次10~20min。可祛风除湿,

活血通络。Copyright © 2010 CNKI. All rights reserved. http://www.cnki.net

[编辑:李巍]