

酶机制是多方面的,故荣肝合剂对 T 淋巴细胞亚群功能、细胞凋亡等方面的干预机制有待进一步研究。

参考文献

[1] Wei HS, Li DG, Lu HM, et al. Effects of AT¹ receptor antagonist, losartan, on rat hepatic fibrosis induced by CCl₄ [J]. World J Gastroenterol, 2000, 6(4) : 540-545.
[2] Liu HL, Li XH, Wang DY, et al. Matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitor of metalloproteinase-1 expression in fibrotic rat liver [J]. World J Gastroenterol, 2000, 6(6) : 881-884.
[3] 曲建慧, 张修礼. ConA 性小鼠肝损伤模型的研究及应用 [J]. 肝脏, 2001, 6(3) : 180-181.
[4] 段富津. 方剂学 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1995: 241-242.
[5] Tiegs G, Hentschel J, Wendel A. A T cell-dependent experimental liver injury in mice inducible by concanavalin A [J]. J Clin Invest, 1992, 90(1) : 196-203.
[6] Imose M, Nagaki M, Kimura K, et al. Leflunomide protects

from T-cell-mediated liver injury in mice through inhibition of nuclear factor kappaB [J]. Hepatology. 2004, 40(5) : 1160-1169.
[7] 王凤云, 唐旭东, 刘燕玲, 等. 荣肝合剂对 ConA 诱导慢性免疫性肝损伤小鼠的影响 [J]. 胃肠病学和肝病杂志, 2008, 17(6) : 492-495.
[8] 王凤云, 唐旭东, 许勇钢, 等. 荣肝合剂对 ConA 诱导慢性免疫性肝损伤小鼠细胞凋亡功能的影响 [J]. 中国中西医结合杂志, 2008, 28(9) : 835-838.
[9] 张引强, 唐旭东, 刘燕玲, 等. 中医药对慢性乙型肝炎保肝降酶作用若干问题的思考 [J]. 中西医结合肝病杂志, 2009, 19(6) : 377-379.
[10] 陈援, 周玫. 自由基医学 [M]. 北京: 人民军医出版社, 1991: 283.
[11] 刘成, 胡义扬, 汪润平, 等. 丹酚酸 A 抗氧化鼠肝损伤的作用 [J]. 世界华人消化杂志, 1999, 7(7) : 570-572.
(收稿日期: 2009-06-22; 修回日期: 2010-04-04)

[编辑: 行之]

· 临床解惑 ·

面瘫的中医辨证施治应注意什么

吴沛田

(海南省三亚市中医医院, 572000)

面瘫分为中枢性和周围性两种, 症状、脑电图、脑 CT 可资鉴别。这里所说面瘫以一侧面部表情肌突然瘫痪, 同侧额皱纹消失, 眼裂扩大, 鼻唇沟变浅, 面部被牵向健侧为主要特征, 即周围性面神经瘫痪。现代医学认为大多数是由急性非化脓性茎乳突孔内的面神经炎引起, 故又称周围性面神经炎、面神经麻痹。属中医学“口眼喎斜”、“吊线风”、“卒口僻”范畴。

在病因病机方面, 中医认为是由络脉空虚, 感受风邪或寒邪, 致气血凝滞, 肌肉纵缓不收所致, 但不排除伏邪诱发和体质倾向。络脉具有易郁易滞的特点, 易为邪气所伏留结聚。伏邪可乘络虚或挟新邪而发; 若素体阳气偏虚, 则易为风寒湿所袭, 形成寒湿阻络证; 若素体阴血不足, 内有郁热, 则易为风湿热所袭, 或风寒湿邪从化蕴热, 形成湿热阻络证。

在治疗方面, 总以“通畅络脉”为目的, 采用分期辨证治疗。早期以络实为主, 当祛邪通络、兼和营卫。如感受寒邪, 症见患侧眼睑不能闭, 口角歪向健侧, 患侧面部紧束疼痛感, 伴麻木, 面色㿠白, 或大便溏泄, 舌苔薄白、舌质淡, 脉弦。治宜温经散寒、通络解痹, 用牵正散加味, 药用白附子、僵蚕、全蝎、白芷、羌活、防风、天麻、麻黄、牛蒡子、红花、地龙、细辛、柴胡。若感受风热, 症见口眼歪斜, 患侧呈麻木火烧样疼痛, 偶有眼皮跳动。伴面红目赤, 五心烦热, 或心烦易怒, 大便燥结, 小便黄, 舌苔薄黄或黄腻, 脉弦数或滑。治宜疏风清热、活络止痛, 方选大秦芩汤加减, 药用秦芩、川芎、当归、白芍、生石膏、黄芩、白芷、生地黄、薄荷、钩藤、胆南星、菊花、连翘、僵蚕、全蝎、地龙。中期虚实夹杂, 当化痰消瘀, 通畅络脉。如痰湿内阻, 除见口眼喎斜外, 尚有头重如蒙, 颜面麻木、知觉较差, 面色青黄, 耳塞耳聩, 呕恶痰涎, 纳食不香, 大便不爽, 舌苔白腻或黄腻, 脉滑或滑数。治宜理气化痰, 祛湿通络, 方选二陈平胃汤、牵正散加减, 药用陈皮、半

夏、苍术、厚朴、茯苓、白附子、僵蚕、全蝎、天南星、地龙、枳实、红花、川芎。若瘀血阻络, 则患侧颜面色暗或有瘀斑, 间有抽掣样疼痛, 往往日轻夜重, 舌苔薄, 舌质暗或边间有瘀斑, 脉细涩或弦。治宜活血化瘀、通络止痛, 方选通窍活血汤加减, 药用赤芍、川芎、桃仁、红花、生姜、地龙、僵蚕、全蝎、白附子、胆南星、半夏、威灵仙、络石藤、郁金。晚期络虚为主, 当培补肝肾、健脾益气、化痰通络。若肝肾阴虚, 面瘫多伴口干咽燥, 两目干涩, 腰膝酸软, 手足心热, 头晕耳鸣, 夜寐不宁, 舌红少苔, 脉细数, 治宜滋养肝肾, 降火通络, 方选二至丸、大补阴丸、牵正散加减, 药用生地黄、龟甲、女贞子、墨旱莲、山茱萸、牡丹皮、泽泻、丹参、川芎、红花、白附子、僵蚕、全蝎、白芥子、黄柏。若脾胃阳虚, 面瘫常伴面色㿠白, 倦怠乏力, 或畏寒肢冷, 腰膝或少腹冷痛, 大便溏薄或尿有余沥, 舌苔薄白或白腻, 舌体胖大, 脉沉弱。治宜温补脾胃, 化痰通络, 方选温经汤、桂枝茯苓丸加减, 药用桃仁、赤芍、红花、黄芪、党参、桂枝、茯苓、半夏、吴茱萸、牡丹皮、僵蚕、全蝎、白附子、鹿角霜、三七粉。

在辨证服药的同时, 配合中药外治大有裨益。如猪牙皂 200g, 研细末, 取适量用陈醋调成糊状, 涂患侧颊车、地仓穴, 每日换药 2 次, 10 天为 1 个疗程; 或用枯矾、生川乌、草乌各等分, 加冰片或麝香少许, 用纱布包如枣核大小, 左歪塞右鼻, 右歪塞左鼻, 2 小时取出, 每日 3 次; 或用羌活、独活、荆芥、忍冬藤、防风各 20g, 猪牙皂 30g, 细辛 8g, 薄荷 8g, 僵蚕、蝉蜕各 15g, 放药罐中加水 1000ml, 煎沸后趁热熏洗患侧面部, 并以文火维持药液沸腾状态, 每次 20~40min, 3 天为 1 个疗程。

值得注意的是, 面部血管神经非常丰富, 刺激过度会适得其反, 所以不能操之过急, 而且针灸疗法不宜过早采用。

[编辑: 李巍]