

2次,口服 ③ 纳洛酮组,使用北京四环制药厂生产的纳洛酮(批号: 920311)4~12mg加入 5% 葡萄糖(或生理盐水)250~500ml 分次或持续静脉滴注,次日视患者情况重复使用 ④ 综合组为中药组和纳洛酮组共同治疗,以上 3组治疗 10d 为 1个疗程

3 疗效观察

3.1 疗效评定标准

痊愈: 症状体征全部消失,生活正常;显效: 症状体征基本消失,生活自理;有效: 症状体征有改善,生活不能自理;无效: 症状体征同治疗前^[2]

3.2 3组临床疗效比较

综合组 40例,痊愈 19例,显效 14例,有效 6例,无效 1例,愈显率为 82.5%,总有效率为 97.5%;中药组 40例,分别为 14例、12例、1例、3例、65%、92.5%;纳洛酮组 40例,分别为 7例、14例、13例、6例、52.5%、85%。3组比较综合组愈显率明显高于中药组和纳洛酮组($P < 0.05$)

4 讨论

中医将 DEACMP 列为“呆病”、“健忘”等范畴。认为气滞血瘀、窍络闭阻为其病理。同时认为,CO 中毒系秽浊毒气伤及气血,闭阻清窍,致气血瘀阻。“脑为元神之府”,瘀血阻滞脉络,气血不能充养于脑,清窍不荣而发本病。久必致脑髓虚损,故为本虚标实证。根据“虚则补之,实则泻之”,“疏其气血,令其条达,而致和平”的原则,以活血化瘀、补肾益脑为大法,标本兼治,以达瘀血散、脑窍通,肝肾补。方中枸杞子、何首乌、五味子补肾益脑;丹参、川芎、当归活血化瘀,疏通脑窍;黄芪、党参益气养血,气行则血行;熟地黄益精填髓。诸药合用,共奏补益肝肾,益智醒脑,活血化瘀,益精填髓之效。现代医学发现,党参能调节神经系统兴奋和抑制过程的平衡;何首乌能显著增加脑和肝中蛋白质含量,促进神经细胞的再生修复;党参和何首乌均有增强机体免疫功效。五味子能改善脑的智力活动,改善中枢分析器之功能;丹参、川芎、当归等能增加心脑血管的血流量,改善微循环,改善脑组织缺血缺氧,促进脑细胞的再生并恢复其功能。同时配合高压氧及其他基础治疗,能较迅速改善脑组织缺血、缺氧,加快脑细胞的再生、脑功能的恢复,增加机体免疫力,缩短疗程,达到提高治愈率的目的。

参考文献

- [1] 王伟娜,袁飞雁,林晶,等.急性一氧化碳中毒后迟发性脑病 24例临床特征分析[J].大连医科大学学报,2008,30(4): 336-338.
- [2] 包晓岩,王超,程慧杰.40例急性一氧化碳中毒迟发性脑病的高压氧治疗效果分析[J].中国工业医学杂志,2004,17(2): 83-84.

犀角地黄汤治疗红皮病 35例

赵雅梅 邢宏春

(广东省深圳市福田区中医院皮肤科,518034)

红皮病是皮肤科中较为危重的病种之一,近年来,我们在临床上使用以水牛角代替犀角的犀角地黄汤配合中医辨证用药治疗红皮病取得一定的疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

采用回顾的方法,分析了 2003~2009 年用犀角地黄汤治疗红皮病的病例,共 35例,其中湿疹引起红皮病 13例,银屑病红皮病 19例,脂溢性皮炎 2例,毛发红糠疹 1例;其中男性 28例,女性 7例;年龄 32~78岁。病程银屑病病史 5个月~14年,湿疹病史 7个月~9年,脂溢性皮炎病史 2~5年,毛发红糠疹病史 2年,红皮病病史 2周~2年。

1.2 诊断标准

红皮病的诊断: 全身皮肤弥漫性潮红、浸润、肿胀、脱屑,累及全身面积 90% 以上^[1]。

2 治疗方法

治疗方法: ① 全部口服犀角地黄汤,水牛角 10~50g,生地 黄 15~30g,赤芍 20g,牡丹皮 10g,石斛 10g,麦冬 10g 挟湿者加薏苡仁、泽泻。② 基础病是银屑病、毛发红糠疹者,加凉血活血汤^[2],处方如下: 生槐花 10~30g,白茅根 10~30g,紫草 15g,丹参 15~30g,鸡血藤 30g;原发病是湿疹、脂溢性皮炎者,加清热除湿汤,处方如下: 龙胆草 5~10g,黄芩 10g,生石膏 10~30g,白茅根 30g,大青叶 15g,车前草 30g,六一散 30g,白鲜皮 30g,徐长卿 20g,路路通 15g 水煎服,每日 1剂,每剂煎水 200ml,每次服 100ml,每日 2次。③ 支持疗法: 根据患者具体情况补充所缺乏的营养成分,如及时纠正低蛋白血症,维持水和电解质平衡,给予多种维生素,皮肤护理等。④ 如果合并有感染,及时控制感染;⑤ 外用药采用安抚治疗。1个月为 1个疗程统计疗效。

3 疗效观察

3.1 疗效判定标准

痊愈: 全身弥漫性潮红、脱屑消退大于 90%,体温恢复正常。显效: 全身弥漫性潮红、脱屑消退 60%~90%,体温恢复正常;有效: 全身弥漫性潮红、脱屑消退 30%~60%,体温恢复正常;无效: 皮损无明显改善。

3.2 结果

35例患者中银屑病 19例,痊愈 3例,显效 8例,有效 5例,无效 3例,总有效率为 84.2%;湿疹 13例,痊愈 5例,显效 3例,有效 3例,无效 2例,总有效率为 84.6%;脂溢性皮炎 2例,痊愈 0例,显效 1例,有效 1例,无效 0例;毛发红糠疹 1例,分别为 0例、0例、0例、1例。

4 讨论

犀角地黄汤在皮肤科有较为广泛的应用,如银屑病、过敏性紫癜、变态反应性疾病等。水牛角出自《名医别录》,性味苦、寒,归心、肝经,具有清热、凉血、解毒功能,用于温病高热、神昏谵语、发疹发斑等证,其成分与犀角相似。一般水牛角的用量是犀角的 5~10倍。

参考文献

- [1] 靳培英.皮肤病药物治疗学[M].北京:人民卫生出版社,2004: 165.
- [2] 赵炳南,张志礼.简明中医皮肤病学[M].北京:中国展望出版社,1983: 170,202.

[编辑: 黄健]