

腺癌发生机制复杂,本研究仅从血管生成机制进行探讨,其相关机制和远期疗效有待进一步研究。

参考文献

[1]Kamangar F, Dores GM, Anderson WF. Patterns of cancer incidence, mortality and prevalence across five continents: defining priorities to reduce cancer disparities in different geographic regions of the world[J]. J Clin Oncol, 2006, 24(14): 2137-2150.

[2]张伟东, 苗树军. 我国恶性肿瘤死亡率流行病学特征分析[J]. 中国健康教育, 2009, 25(4): 246-248.

[3]张颖, 张瑞菊. 八珍汤抗肿瘤及补气血的药理临床研究进展[J]. 河北中西医结合杂志, 1998, 7(12): 1876-1877.

[4]王蕾. 八珍汤加减治疗结直肠癌术后 30 例[J]. 河北中医, 2004, 26(9): 692-693.

[5]刘华, 曾柏荣, 许利纯. 加味八珍汤配合化疗治疗晚期胃癌疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志, 2006, 15(24): 3366.

[6]黄智芬, 施智严, 黎汉忠, 等. 八珍汤加味配合化疗治疗晚期大肠癌 31 例临床观察[J]. 河北中医, 2008, 30(12): 1283-1285.

[7]中国抗癌协会乳腺癌专业委员会. 中国抗癌协会乳腺癌诊治指南与规范(2007 版)[J]. 中国癌症杂志, 2007, 17(5): 6-12.

[8]郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 378-383.

[9]顾晓鸣, 陆群, 沈伟. 运用 Excel“随机数发生器”进行随机化分组[J]. 中国医院统计, 2007, 14(3): 287-288.

[10]Duffaud F, Therasse P. New guidelines to evaluate the response to treatment in solid tumors [J]. Bull Cancer, 2000, 87(12): 881-886.

[11]Weidner N. Current pathologic methods for measuring intratumoral microvessel density within breast carcinoma

and other solid tumor[J]. Breast Cancer Res Treat, 1995, 36(2): 169-180.

[12]阙华发, 高尚璞, 陈红凤, 等. 乳宁 II 号对人乳腺癌 MDA-MB-435 细胞株生长转移的影响[J]. 中国中医基础医学杂志, 2002, 8(7): 32-34.

[13]Sipos B, Klapper W, Kruse ML, et al. Expression of lymphangiogenic factors and evidence of intratumoral lymphangiogenesis in pancreatic endocrine tumors[J]. Am J Pathol, 2004, 165(4): 1187-1197.

[14]汪蕊, 陈睿, 杨婉华, 等. VEGF-C 和 VEGF-R³ 在乳腺癌中的表达及与淋巴结转移的关系[J]. 肿瘤防治研究, 2006, 33(6): 385-387.

[15]Ryden L, Linderholm B, Nielsen NH, et al. Tumor specific VEGF-A and VEGFR²/KDR protein are co-expressed in breast cancer[J]. Breast Cancer Res Treat, 2003, 82(3): 147-154.

[16]Celen O, Kahraman I, Yildirim E, et al. Correlation of vascular endothelial growth factor (VEGF) and CEA with clinicopathological variables in colorectal cancer patients [J]. Neoplasma, 2004, 51(4): 293-299.

[17]栗连秀, 陈红秋, 杨达平, 等. 血管内皮生长因子和 p⁵³ 在乳腺癌中的表达及其临床意义[J]. 广西医科大学学报, 2006, 23(4): 602-603.

[18]丁杰, 廖国庆, 王万川, 等. 艾迪对结直肠癌血管生成抑制的临床研究[J]. 肿瘤, 2007, 27(2): 142-146.

[19]孙立新, 武燕, 连润生, 等. 血管内皮生长因子、p⁵³ 在卵巢上皮癌中表达的临床意义[J]. 肿瘤研究与临床, 2004, 16(5): 306.

(收稿日期: 2009-11-16; 修回日期: 2010-07-06)

[编辑: 行之]

全国院内制剂的名方、验方的开发应用及申报路径高峰论坛通知

为充分发挥中医药在维护人民健康、促进经济社会发展和弘扬我国优秀传统文化等方面的重要地位和作用, 中华中医药学会拟举办全国院内制剂的名方、验方的开发应用及申报路径高峰论坛, 同时将在全国重点开展扶持名方、验方的发掘和整理, 开发院内制剂的科学规范应用试点工作。现展开全国各医疗机构院内制剂的全面调查工作, 请给予支持和配合。

一、项目支持内容

1. 对经专家评审通过的院内名方制剂提供资金支持。2. 定期提供技术人员跟踪项目实施情况。3. 协助医疗机构完成院内制剂批文申报。4. 降低研发风险和开发成本, 缩短院内制剂的开发周期。5. 协助医疗机构对已取得制剂批文的院内制剂进行技术改良、委托配制等相关事项。6. 提供“名院、名科、名医、名药”规划方案。7. 优秀论文将推荐到《世界中西医结合杂志》等国家级核心期刊发表。8. 协助科学技术进步奖、自然科学奖、技术发明奖的推荐工作。

二、项目的意义

本项目支持医院把临床有效方剂转化成符合 GMP 标准的院内制剂, 是“名医、名科、名院”工程的具体措施之一, 能最大限度地促使中医药制剂科技成果转化, 从而扩大医院的社会效益和经济效益。

三、申报条件

持有《医疗机构执业许可证》并取得相应业务范围的《医疗机构诊疗科目核定表》的医疗机构: 1. 制剂名称及命名依据。2. 立题目的以及该品种的市场供应情况。3. 证明性文件。4. 标签及说明书设计样稿。5. 处方组成、来源、理论依据以及使用背景情况。

四、组织机构

主办单位: 中华中医药学会 协办单位: 中华中医药学会药房管理分会

五、联系方式

地址: 中国广州市沿江中路 298 号江湾商业中心 1307 室, 邮编: 510110。1. 中华中医药学会: 王奕(010-64274797) 2. 组委会: 何辉园(020-83283661, 13798118960, 传真: 020-83283667, E-mail: hehuatcm@yahoo.cn) 会议具体事项请访问 <http://www.hehuatcm.com>。