

· 临床报道 ·

自拟四逆养胃汤配合西药治疗消化性溃疡 110 例

赵 茂 富

(句容市下蜀中心卫生院, 江苏省句容市下蜀镇, 212411)

通讯方式:jrxszmf@163.com, 13952997892

【关键词】 消化性溃疡; 中西医结合疗法; 四逆养胃汤

笔者自 2005 年 9 月~2010 年 8 月期间, 用自拟四逆养胃汤随症加减, 配合奥美拉唑等西药, 治疗消化性溃疡 110 例, 并设对照组 55 例, 现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

两组 165 例均为江苏省句容市下蜀中心卫生院门诊患者, 有比较典型的消化性溃疡病史, 接受治疗前有比较明显的消化性溃疡症状。全部病例经纤维胃镜检查确诊为消化性溃疡, 同时作了幽门螺杆菌(Hp)检查。治疗组 110 例, 男 58 例, 女 52 例; 年龄 35~66 岁, 平均 43 岁; 病程 1~3 年 48 例, 4~7 年者 45 例, 7 年以上者 17 例; 十二指肠球部溃疡 63 例, 胃溃疡 35 例, 复合性溃疡 12 例。对照组 55 例, 男 31 例, 女 24 例; 年龄 32~64 岁, 平均 42 岁; 病程 1~3 年者 26 例, 4~7 年者 24 例, 7 年以上者 5 例; 胃溃疡 16 例, 十二指肠球部溃疡 35 例, 复合性溃疡 4 例。两组临床资料比较, 差异无统计学意义($P>0.05$)。

1.2 诊断标准

依据《实用内科学》^[1]中有关溃疡病诊断标准确定诊断。所选病例均排除胃恶性病变及消化道出血、溃疡穿孔或幽门梗阻等并发症。

2 治疗方法

2.1 治疗组

四逆养胃汤: 柴胡 10g, 枳实 15g, 白芍 30g, 甘草 10g, 黄芪 15g, 佛手 10g, 白及 15g, 乌贼骨 30g, 赤芍 15g, 莪术 10g, 蒲公英 30g。每日 1 剂, 分 2 次服, 同时每次给予口服奥美拉唑 20mg, 阿莫西林 1000mg, 克拉霉素 500mg, 每日 2 次, 治疗 2 周, 再口服奥美拉唑 20mg, 每日 2 次, 治疗 2 周。

2.2 对照组

给予西药口服, 每次奥美拉唑 20mg, 阿莫西林 1000mg, 克拉霉素 500mg, 每日 2 次口服, 治疗 2 周, 再口服奥美拉唑 20mg, 每日 2 次, 治疗 2 周。

以上两组均嘱患者注意饮食调节, 忌食辛辣烟酒刺激之物, 调畅情志, 劳逸有度。4 周为 1 个疗程, 两组均观察 2 个疗程后统计疗效。

3 疗效观察

3.1 疗效标准

参照《中药新药临床研究指导原则》^[2]中胃镜疗效判定标准拟定。治愈: 溃疡完全消失, 局部轻度充血, 无明显水肿, 自觉症状全部消失或基本消失; 显效: 溃疡基本消失, 仍有明显炎症, 主要症状消失; 有效: 溃疡面积缩小 50% 以上, 主要症状明显减轻; 无效: 溃疡面积缩小不足 50%, 自觉症状无改善。

3.2 两组疗效比较

表 1 示, 治疗组总有效率为 98.18%, 对照组为 89.09%, 两组比较, 治疗组疗效明显为优($P<0.05$)。

表 1 两组临床疗效比较(例)

组别	例数	治愈	显效	有效	无效	总有效
治疗组	110	88	11	9	2	108
对照组	55	35	8	6	6	49

4 讨论

四逆养胃汤主要从四逆散加减而成, 以期达到调和肝脾, 扶脾益胃之效。方中柴胡、枳实、佛手调理气机, 疏解郁结; 赤芍、莪术化瘀行滞; 黄芪、甘草益气健脾; 白芍养血柔肝, 具有缓急舒挛、止痛和中之效; 乌贼骨、白及止血生肌; 蒲公英清泻胃热。加之西药克拉霉素与阿莫西林合用对 Hp 有杀灭作用; 奥美拉唑抑酸, 促进溃疡愈合和临床症状消除。

参考文献

- [1] 陈灏珠. 实用内科学[M]. 11 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 1565-1579.
- [2] 郑筱萸. 中药新药临床研究指导原则(试行)[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002: 151-155.