

制及预防 DF 溃疡感染。

## 参考文献

- [1] 梁晓春. 糖尿病手册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007: 4.
- [2] 王旭, 杨亚平. 糖尿病的中医特色疗法[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2004: 7.
- [3] 李敬林, 王太一, 王禄增, 等. 2 型糖尿病证病结合动物模型的研究[J]. 中国比较医学杂志, 2007, 17(8): 473 - 475.
- [4] 王宏丽, 常向云, 孙侃, 等. ICAM-1、TG 在大鼠糖尿病性下肢溃疡中的意义[J]. 现代生物医学进展, 2009, 9(4):

709 - 711.

- [5] 沈璐, 胡筱娟, 李群, 等. 中药辨证内服外洗治疗糖尿病足 46 例[J]. 陕西中医, 2004, 25(6): 488 - 489.
- [6] 李慧, 邹大进. 2 型糖尿病及肥胖与慢性炎症因子[J]. 第二军医大学学报, 2003, 24(11): 1244 - 1246.
- [7] 廉波, 马冬梅. 脉络宁合并前列腺素 E<sub>1</sub> 治疗糖尿病足 32 例临床观察[J]. 疑难病杂志, 2004, 3(6): 352 - 354.
- [8] 牛永国, 孟波. 糖尿病足感染的细菌学与药敏分析[J]. 临床医学, 2009, 29(2): 105.

(收稿日期: 2010-09-26; 修回日期: 2011-03-16)

[编辑: 行之]

## • 临床解惑 •

### 怎样分型辨治胸膜炎

王 付 郑 攀

河南中医学院经方研究所, 450008)

胸膜炎是由感染性炎症(结核性、化脓性、寄生虫性、真菌性)、肿瘤、变态反应性疾病、胶原病等所引起的胸腔疾病。本病以胸胁疼痛为主要表现, 采用分型辨治用方, 常常能取得预期治疗效果, 尤其是控制胸胁疼痛效果最为明显, 试将其辨治分型介绍于次。

1 热结痰饮证: 咳嗽, 胸胁痛, 咳唾牵引胸胁疼痛, 或呼吸困难, 或气喘, 或喘促不能平卧, 或胸廓隆起, 口渴不欲多饮水, 舌红, 苔黄腻, 脉沉紧或滑。治当清热化痰, 泻热利水; 可选用大陷胸汤, 药用: 大黄 18g, 芒硝 24g, 甘遂 1.5g; 或选用十枣汤, 芫花、甘遂、大戟各等份(各 0.2g)。若咳嗽者, 加葶苈子、桑白皮, 以泻肺止咳; 若痰多者, 加杏仁、瓜蒌, 以降肺化痰; 若胸痛者, 加郁金、川楝子, 以行气活血止痛; 若大便干结者, 加大黄、芒硝, 以泻饮通便; 若小便少者, 加车前子、泽泻, 以通利小便。

2 寒结痰饮证: 咳嗽, 胸胁痛, 咳唾牵引胸胁疼痛, 或呼吸困难, 或气喘, 或喘促不能平卧, 或胸廓隆起, 手足不温, 口淡不渴, 舌淡, 苔白腻, 脉沉紧或滑。治当温化痰饮, 降逆泻饮; 可选用三物白散, 药用: 桔梗 9g, 巴豆 3g, 川贝母 9g(汤剂用巴豆一般不超过 1g)。若胸胁疼痛者, 加薤白、厚朴、川楝子, 以行气宽胸止痛; 若痰多者, 加天南星、半夏, 以燥湿化痰; 若苔腻者, 加苍术、陈皮, 以理气燥湿化痰; 若咳喘者, 加麻黄、杏仁, 以宣降肺气。

3 热结络证: 咳嗽, 胸胁疼痛因深呼吸、转侧加重胸胁, 往来寒热, 或发热不恶寒, 或呼吸困难, 口苦, 或心下痞满, 或干呕, 口咽干燥, 饮水不多, 舌红, 苔黄腻, 脉沉紧或滑。治当清热散结, 通络止痛; 可选用大柴胡汤与小陷胸汤合方, 药用: 柴胡 24g, 黄芩 9g, 白芍 9g, 半夏 12g, 生姜 15g, 枳实 4g, 大枣 12 枚, 黄连 3g, 半夏 12g, 瓜蒌 30g(若大便干结改用大黄 6g)。若咳嗽者, 加麻黄、杏仁、石膏, 以宣降肺气, 清热止咳; 若痰黄者, 加浙贝母、胆南星, 以清热化痰; 若气虚者, 加人参、白术, 以益气健脾; 若胸胁疼痛者, 加郁金、青皮、桃仁, 以行气活血止痛。

4 寒结络证: 咳嗽, 胸胁疼痛因深呼吸、转侧加重, 或痛因温减, 手足不温, 或呼吸困难, 或大便溏泄, 心下痞满, 或干呕, 口淡不渴, 舌质淡, 苔白腻, 脉沉紧或弦。治当温阳散结,

通络止痛; 可选用四逆汤与苓桂术甘汤合方, 药用: 干姜 5g, 附子 5g, 茯苓 12g, 桂枝 9g, 白术 6g, 甘草 6g。若咳嗽者, 加麻黄、杏仁、百部, 以宣降肺气止咳; 若痰白者, 加陈皮、苏子、白芥子, 以温化痰涎; 若气虚者, 加人参、白术, 以益气健脾; 若胸胁疼痛者, 加郁金、青皮、香附、桃仁, 以行气活血止痛。

5 气郁络证: 咳嗽, 胸胁疼痛, 表情沉默, 或胸胁窒痛, 或胸廓变形, 或呼吸困难, 呼吸不畅, 或胸闷, 胸胀, 情绪异常加重, 舌质淡红, 苔薄, 脉弦或沉。治当行气散结, 通络止痛; 可选用柴胡疏肝散与金铃子散合方, 药用: 柴胡 12g, 陈皮 12g, 川芎 9g, 枳壳 9g, 白芍 9g, 香附 9g, 炙甘草 3g, 川楝子 15g, 延胡索 15g。若胸闷者, 加木香、厚朴、薤白, 以行气宽胸; 若咳嗽者, 加百部、前胡、紫菀, 以宣降肺气止咳; 若夹热者, 加栀子、淡豆豉、青皮, 以清热通络; 若夹寒者, 加桂枝、细辛, 以温阳通络。

6 痰瘀阻结证: 咳嗽, 痰多, 胸胁疼痛如针刺, 或夜间加重, 或因深呼吸、转侧加重胸胁疼痛, 或呼吸困难, 肢体困重, 胸中憋闷, 心下痞满, 或干呕, 舌质暗紫夹瘀点, 苔厚腻, 脉沉紧或涩。治当燥湿化痰, 活血化瘀; 可选用半夏厚朴汤与抵当汤合方, 药用: 半夏 24g, 厚朴 9g, 茯苓 12g, 生姜 15g, 紫苏叶 6g, 水蛭 6g(水蛭量以 3g 始, 逐渐加大用量), 虻虫 6g, 桃仁 4g, 大黄 9g。若咳嗽者, 加紫菀、款冬花、百部, 以宣降肺气止咳; 若胸闷者, 加陈皮、枳实、薤白, 以行气宽胸; 若胸胁疼痛者, 加川楝子、延胡索, 以行气活血止痛; 若心下痞满者, 加山楂、麦芽、莱菔子, 以消食和胃。

7 阴虚饮结证: 咳嗽, 胸胁疼痛, 或呼吸困难, 胸闷, 或胸胀, 或呼吸不畅, 或形体消瘦, 或痰少而黏, 或胸廓变形, 潮热, 或五心烦热, 舌红少苔, 或苔薄黄腻, 脉弦或细数。治当滋阴清热, 化饮通络; 可选用百合固金汤与小半夏加茯苓汤合方, 药用: 百合 9g, 熟地黄 18g, 生地黄 18g, 当归身 18g, 白芍 6g, 甘草 6g, 桔梗 5g, 玄参 5g, 浙贝母 9g, 麦冬 9g, 半夏 24g, 生姜 24g, 茯苓 9g。若饮甚者, 加泽泻、猪苓, 以利水涤饮; 若阴虚者, 加沙参、玉竹, 以滋补阴津; 若不思饮食者, 加山楂、神曲, 以消食和胃; 若胸胁痛者, 加枸杞子、女贞子、川芎, 以滋阴活血, 通络止痛。

[编辑: 李 巍]