

• 名方应用 •

补阳还五汤治验实录

1 范文甫治疗中风医案

陈老师母, 风生于脏腑, 猝然而倒, 不省人事, 牙关紧闭, 喉中痰鸣, 遗溺。证已到危险极巅, 按脉幸尚不散, 还有希望。先用苏合香丸 1 粒, 鲜竹沥 24g, 生姜汁 1 匙灌服。醒后服下方:

生黄芪 30g, 赤芍 9g, 归身 6g, 地龙 6g, 桃仁 9g, 红花 6g, 淡附子 9g, 炙甘草 3g, 半夏 9g。

二诊: 见效, 神清。惟半身偏瘫, 舌强言謇。补阳还五汤。《《近代名医学术经验选编·范文甫专辑》》

2 姚和清治疗目赤医案

蒋某, 男, 54 岁。初诊于 1943 年 11 月 5 日。

平素头晕, 脑中昏愤, 近来左目发赤, 白睛血瘀, 色似胭脂。脉弦数, 舌质红。此系肝阳亢盛, 邪火妄动, 火载血上逆, 不循经络, 溢于清窍。治宜平肝散血。补阳还五汤去黄芪, 加黄芩、石决明。3 剂。

二诊: 白睛血瘀大部退去, 晕眩亦减, 脉仍弦。知其肝阳尚炽, 当再守原意。补阳还五汤去黄芪, 加珍珠母。5 剂。《《姚和清眼科证治经验与医案》》

3 陆南山治疗高血压动脉硬化眼底出血医案

管某, 男, 64 岁。1973 年 1 月 20 日初诊。

主诉: 自 1972 年春起发现有高血压, 血压最高为 200/110mmHg。曾患口眼喎斜, 经治疗后痊愈, 最近右眼视力下降。

检查: 右眼视力 0.2, 左眼 0.4, 两眼底视网膜动脉变细呈铜丝状, 动静脉比例为 1:2, 动脉反光增强, 动静脉有交叉压迫, 右眼在黄斑附近出血较多。

全身体征: 脉象弦而兼革, 搏指有力, 体丰, 精神萎软。

辨证施治: 体丰气虚, 气虚则不能摄血归经, 故眼底出血斑斑。先拟补气消瘀, 然后再图其本。治以补阳还五汤: 炙黄芪 18g, 赤芍 9g, 全当归 9g, 地龙 3g, 川芎 3g, 桃仁 1.5g, 红花 3g。

上方开始服 5 剂后, 眼底出血即见好转, 因此原

方加茜草根、小蓟, 连续又服 50 剂后, 左眼底出血完全吸收, 视力亦已进步至右眼 0.4, 左眼 0.5, 矫正视力未查。以后调理高血压。随访至 1975 年 1 月(已 2 年), 复查眼底未见出血。《《眼科名家陆南山学术经验集》》

4 岳美中治疗震颤麻痹医案

余曾治农林部某男性患者, 70 岁, 患震颤麻痹。初诊时两手震颤, 不能自行上汽车, 步态慌张, 坐立不稳, 脉虚弱, 重按欲无, 舌有少量瘀点。给予补阳还五汤, 地龙用三钱, 黄芪自首剂二两, 逐渐加至八两, 服药半年而缓解。《《岳美中医话集(增订本)》》

5 颜德馨治疗下肢深部静脉炎医案

章某, 男, 62 岁。

病史: 患者阑尾切除术后出现右下肢深部静脉炎, 行动后疼痛加剧。由外地转诊来沪住院。

初诊: 右下肢深部静脉炎, 局部皮温较低, 肝掌, 自觉胸痞心悸, 脉沉涩, 舌紫苔薄。证属气滞血瘀, 复以高年积劳, 气分已虚, 气虚则血流不畅, 更益瘀血之势。故拟益气化瘀, 温通血脉, 标本兼施。

方药: 生黄芪 15g, 当归 9g, 红花 9g, 桃仁 12g, 广地龙 6g, 川牛膝 12g, 漏芦 9g, 威灵仙 12g, 川芎 9g, 王不留行 9g, 桂枝 4g。4 剂。

二诊: 药后下肢得汗, 但腕次不适, 脉右细左弦滑。气分不足, 瘀阻络脉。因有胃病史, 应予兼顾。

方药: 上方加木香 6g。4 剂。

三诊: 下肢有汗, 为循环来复之机, 静时无所苦, 活动后微有痛楚, 较以往为缓。药后胸宇痞胀亦有好转, 脉右细左弦。气虚乃其本, 瘀滞乃其标, 瘀者淤也, 得热则通, 取此义而增删。

方药: 同上方加鹿角 9g, 桂枝加为 6g, 去漏芦。连服 12 剂, 症状完全消失而出院。《《中华名中医治病囊秘·颜德馨卷》》

(选自《一选方治验实录》, 人民卫生出版社 2011 年 1 月出版)